

CORONAVIRUS – DIRECTRICES A FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS

La Federación Internacional Farmacéutico (FIP) publicó el pasado 6 de febrero de 2020 un documento con información recopilada sobre directrices y orientación a los farmacéuticos y personal de farmacias sobre el brote de coronavirus que ha alertado a las poblaciones a nivel mundial. Este virus, al cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente le ha dado el nombre de CoViD-19, forma parte del grupo de virus que causan enfermedades desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.

El documento, titulado "**Brote de Coronavirus SARS-CoV-2: Información y orientación provisional para los farmacéuticos y el personal de las farmacias**", tiene el propósito de *"proporcionar información y directrices pertinentes sobre los brotes de coronavirus -y en particular sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2- a los farmacéuticos y al personal de farmacia, tanto en el contexto de la atención primaria (es decir, las farmacias comunitarias y los centros de atención primaria de salud) como en los entornos hospitalarios, así como a los farmacéuticos que trabajan en laboratorios de análisis clínicos, y ofrecer un conjunto de referencias que puedan consultarse para obtener más información"*. La FIP hace énfasis en que el documento va dirigido a *"ayudar a los farmacéuticos y al personal de las farmacias a prevenir la propagación de la enfermedad y contribuir a su gestión eficaz en el sistema de atención de la salud"*.

La información y directrices incluyen identificación de decisiones para el asesoramiento por farmacéuticos comunitarios y actividades mediadas por la farmacia, entre ellas las siguientes áreas:

- Medidas preventivas en las cuales el farmacéutico y el personal de la farmacia pueden desempeñar un papel clave para la prevención de propagación del coronavirus;
- Detección / Triage siguiendo criterios para guiar la evaluación de los pacientes bajo investigación para SARS-CoV-2 recomendados por Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC) en 2020;
- Atención domiciliaria para pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 que presenten síntomas
- Lista de medicamentos clave para tratamiento de infecciones por SARS-CoV2
- Lista de instalaciones, equipos y dispositivos de protección personal clave.










Como uno de los anexos del documento se incluye "*Árbol de decisiones para el asesoramiento por farmacéuticos comunitarios*" que aquí se reproduce en la siguiente página.

PARA ACCESO AL DOCUMENTO, AQUÍ LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

www.fip.org/coro

CORONAVIRUS SARS-CoV-2

ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO

 <p>No hay síntomas (tos, fiebre o dificultades respiratorias)</p>	 <p>No hay antecedentes de viajes a las zonas afectadas ni de contacto con personas infectadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasladar un mensaje de tranquilidad • Es muy poco probable que haya un riesgo de infección por SARS-CoV-2 • Destacar las medidas preventivas • Proporcionar información y asesoramiento basado en la evidencia (oral y/o escrito)
 <p>Síntomas (tos, fiebre o dificultades respiratorias)</p>	 <p>No hay antecedentes de viajes a las zonas afectadas ni de contacto con personas infectadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasladar un mensaje de tranquilidad • Es poco probable que haya un riesgo de infección por SARS-CoV-2 • Destacar las medidas preventivas • Proporcionar información y asesoramiento basado en la evidencia (oral y/o escrito)
 <p>No hay síntomas (tos, fiebre o dificultades respiratorias)</p>	 <p>Historial de viajes recientes a zonas afectadas o contacto con personas infectadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasladar un mensaje de tranquilidad • Puede existir el riesgo de una infección de SARS-CoV-2 • Destacar las medidas preventivas y recomendar la cuarentena domiciliaria durante 14 días • Rastrear la historia de contactos • Proporcionar información y asesoramiento basado en la evidencia (oral y/o escrito) • En caso de que los síntomas aparezcan en los 14 días siguientes al regreso del viaje o al contacto con la persona infectada, póngase en contacto con el número de emergencia o el hospital de referencia
 <p>Planes de viaje a las zonas afectadas o contacto con personas infectadas</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Trasladar un mensaje de tranquilidad • Puede existir el riesgo de una infección de SARS-CoV-2 • Recomendar la cuarentena del hogar durante 14 días al regreso del viaje. • Informar sobre la situación y las formas de transmisión • Destacar las medidas preventivas • Proporcionar información y asesoramiento basado en la evidencia (oral y/o escrito)
 <p>Síntomas (tos, fiebre o dificultades respiratorias)</p>	 <p>Historial de viajes recientes a zonas afectadas o contacto con personas infectadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasladar un mensaje de tranquilidad • El riesgo de infección por SARS-CoV-2 puede existir • Contactar con las autoridades sanitarias para iniciar el protocolo de atención • Informar sobre el procedimiento de aislamiento, diagnóstico y tratamiento • Destacar las medidas para prevenir nuevos posibles contagios • Proporcionar información y asesoramiento basado en la evidencia (oral y/o escrito)