

Segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

El pasado 29 de marzo de 2022 la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron una segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 de las compañías Pfizer-BioNTech y Moderna para personas mayores y ciertos individuos inmunosuprimidos. Esta acción pone a disposición una segunda dosis de refuerzo de estas vacunas para poblaciones con mayor riesgo de enfermarse gravemente, ser hospitalizadas y de morir debido a infección por SARS-Cov2. La evidencia emergente sugiere que una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 mejora la protección contra el COVID-19 grave y no está asociada con nuevos problemas de seguridad.

La evidencia actual sugiere cierta disminución con el tiempo de la protección contra consecuencias graves de COVID-19 en personas mayores e inmunosuprimidas. Según un análisis de datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna podría ayudar a aumentar los niveles de protección para estas personas que tienen un mayor riesgo.

Las agencias modificaron las autorizaciones de uso de emergencia y las recomendaciones de vacunación de la siguiente manera:

- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de **Pfizer-BioNTech o de Moderna** a personas mayores de **50** años al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.
- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de **Pfizer-BioNTech** a personas de **12** años o más con ciertos tipos de inmunosupresión al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada. Estas son personas que se han sometido a un trasplante de órganos o que viven con condiciones que se considera que tienen un nivel equivalente de inmunosupresión.
- Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de **Moderna** a personas mayores de **18** años con los mismos ciertos tipos de inmunosupresión al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.
- Se recomienda que los adultos que recibieron una vacuna primaria y una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Janssen (Johnson & Johnson) hace al

menos 4 meses pueden recibir una segunda dosis de refuerzo con una vacuna contra COVID-19 de ARN mensajero (ARNm) (**Pfizer-BioNTech o Moderna**).

Para información adicional, pueden acceder los siguientes enlaces:

[March 29, 2022 - Coronavirus \(COVID-19\) Update: FDA Authorizes Second Booster Dose of Two COVID-19 Vaccines for Older and Immunocompromised Individuals](#)

[CDC's Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States](#)